

Protocolo para pacientes con síntomas o resultado positivo de COVID-19

(Adaptado de acuerdo a los resultados con 100 pacientes en Ecuador)

Material requerido:

Frasco gotero de Solución de Dióxido de Cloro (CDS) a 3000 ppm (*cada frasco contiene 30 ml, el tratamiento completo de un día*). **Consérvese en refrigeración.**

Procedimiento:

Después del desayuno:

Primera administración del día:

Una hora después del desayuno, en medio vaso de agua fría, colocar 50 gotas de CDS (3000 ppm) y beber completo.

Repetir cada 15 minutos por 2 horas, es decir se deben consumir 8 medios vasos de agua en total cada uno con 50 gotas de CDS.

Dejar pasar dos horas

Segunda administración del día:

Deberá realizarse con un ayuno mínimo de una hora. En medio vaso de agua fría, colocar 25 gotas de CDS (3000 ppm) y beber completo.

Repetir cada 15 minutos por 2 horas, es decir se deben consumir 8 medios vasos de agua en total cada uno con 25 gotas de CDS.

Repetir este esquema por 4 días al menos

CONSIDERACIONES IMPORTANTES:

1. No tomar alimentos, fármacos o medicamentos una hora antes y una hora después de tomar el CDS.
2. Evitar la Vitamina C o ácido ascórbico y otros suplementos y antioxidantes durante los 4 días de tratamiento.
3. Registre cualquier cambio o manifestación que note durante el tratamiento. (Fiebre, tos, diarrea, estreñimiento, dolores, etc.)